

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



INSETTICIDI E LARVICIDI

INSECTOSEC®

INSETTICIDA E ACARICIDA IN POLVERE PRONTO USO DA USARE
CONTRO GLI INSETTI STRISCIANTI

CARATTERISTICHE

InsectoSec® viene utilizzato per il controllo degli insetti striscianti come **scarafaggi**, **formiche** e **acari rossi del pollo**. InsectoSec® è costituito per il 100% da kieselgur, una sostanza costituita da gusci di diatomee fossili (anche denominata terra diatomacea), una forma di biossido di silicio amorfo (non cristallino) presente in natura. La sostanza attiva provoca la dissoluzione dei grassi della cuticola e la disidratazione quindi degli insetti.

InsectoSec® viene utilizzato nei recinti per il pollame, nelle aree industriali ed istituzionali e nelle abitazioni private.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Ho.re.ca., Industria, Industria Alimentare, Zootecnia

Aut. Biocida: IT/2023/00858/MRP 1-1

Biocida

INFESTANTI TARGET

Scarafaggi (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*), formiche (*Lasius niger*) e acari rossi del pollo (*Dermanyssus gallinae*).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

APPLICAZIONE CONTRO SCARAFAGGI, FORMICHE E ACARO ROSSO DEL POLLO (POLVERIZZAZIONE MEDIANTE IRRORAZIONE SULLE SUPERFICI)

Si tratta di un prodotto da applicare su piccola scala in ambienti asciutti contro scarafaggi, formiche e acaro rosso del pollo. E' necessario identificare i nascondigli e le superfici di camminamento degli insetti. Per il trattamento di insetti nei pollai, trattare l'ambiente. Non applicare direttamente sugli animali.

Dose contro gli insetti striscianti (scarafaggi e formiche): 7 g/m²

Dose contro l'acaro rosso del pollo: 50 g/m²

Il prodotto contenuto nei sacchi e nei secchi dovrebbe essere trasferito in un polverizzatore a comando manuale (come, ad esempio, uno spargi polvere o piccoli polverizzatori a soffietto manuali) prima dell'applicazione. Riempire il dispositivo di applicazione con il cucchiaino dosatore.

Per gli scarafaggi: applicare su crepe e fessure e negli spazi cavi in cui possono essere presenti insetti. Applicare sulle superfici di camminamento degli insetti.

Per le formiche: applicare sulle superfici di camminamento degli insetti.

Per l'acaro rosso del pollo: applicare come trattamento generico delle superfici. Trattare anche crepe, fessure, spazi vuoti e superfici di camminamento o tutti gli altri luoghi nei quali gli acari possono nascondersi o insidiarsi. InsectoSec® può essere usato come prevenzione e in caso di infestazione. Non applicare direttamente sul pollame.

Trattamento preventivo: applicazione sul recinto per il pollame pulito e asciutto prima dell'arrivo degli animali. Spruzzare una quantità di prodotto a ricoprire tutte le superfici con una pellicola bianca (circa 50 g/m²).

Trattamento curativo: applicazione sul recinto per il pollame con infestazione quando gli animali sono all'esterno. Spruzzare una quantità di prodotto a ricoprire tutte le superfici con una pellicola bianca (circa 50 g/m²).

Applicare direttamente sugli insetti, ove possibile. Applicare nuovamente dopo 7 giorni ove necessario. La riduzione si osserva dopo 1-3 settimane.

APPLICAZIONE CONTRO LE FORMICHE (TRATTAMENTO A BARRIERA MEDIANTE POLVERIZZAZIONE)

Il prodotto è usato in casa ed attorno alla stessa.

Il prodotto è applicato attorno all'apertura del nido e sulle superfici di camminamento delle formiche. Trattamento a barriera.

Dose di applicazione (trattamento di polverizzazione): 5 g/nido

Dose di applicazione (trattamento a barriera): 7 g/m, larghezza della barriera 1-3 cm

Il prodotto contenuto nei sacchi e nei secchi può essere trasferito in una bottiglia per il versamento oppure essere applicato direttamente con un cucchiaino dosatore.

Applicare il prodotto all'aperto esclusivamente in condizioni meteorologiche asciutte.

Se vi sono molte entrate al nido, applicare il prodotto omogeneamente su tutte le entrate.

Ripetere il trattamento qualora, dopo 24 ore, tutto il prodotto sia stato rimosso dalle formiche. Non applicare per più di 3 volte/nido. Non applicare il prodotto se dovesse essere prevista pioggia entro 24 ore. Riduzione delle formiche in 1-3 settimane.

COMPOSIZIONE

Biossido di silicio (Kieselgur): 100%

PZ/CARTONE

SACCO 1 kg x 6 pz

SACCO 15 kg x 1 pz