

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



INSETTICIDI E LARVICIDI

LINEA

IMPACT GEL FORMICHE

ESCA INSETTICIDA IN GEL PRONTA ALL'USO DA APPLICARE IN GOCCE

CARATTERISTICHE

VICTOR GEL FORMICHE è un insetticida in formulazione gel efficace contro formiche comuni e tropicali, tra le quali formica nera (*Lasius niger*), formica argentina (*Linepithema humile*) e formica faraone (*Monomorium pharaonis*). Il prodotto può essere utilizzato in interni (abitazioni private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) ed intorno ad edifici (perimetro di edifici, terrazze e giardini privati). Il prodotto può essere applicato utilizzando cartucce/siringhe per il controllo delle tre specie di formiche sopracitate. Per il controllo della formica argentina, il prodotto può essere posto all'interno di stazioni di adescamento.

VICTOR GEL FORMICHE può portare all'eradicazione dell'intera colonia: il suo effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, consente alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui presenti del nido, comprese regine e larve, attraverso il particolare fenomeno denominato *Trofallassi*, che prevede la condivisione di cibo tra individui della stessa colonia.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Aree Verdi, Ho.re.ca., Industria, Industria Alimentare, Mezzi di trasporto, Ospedali

Aut. Biocida: IT/2017/00442/MRP - VictorGelFormiche

Biocida

INFESTANTI TARGET

Formiche comuni e tropicali

COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro: 0,01%

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche.

VICTOR GEL FORMICHE deve essere applicato in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nelle aree in cui le formiche sono presenti, in prossimità dei nidi, presso i loro percorsi o in crepe e fessure. Per utilizzo in esterni (terrazze, pati, cortili o giardini), il prodotto va applicato nei posti di maggiore presenza: cornicioni e nei punti di entrata di cavi.

Si consiglia di lavarsi le mani prima di utilizzare l'esca, per evitare contaminazioni con odori sgradevoli come tabacco, ecc... Nessuna spruzzatura o nebulizzazione di prodotti chimici vicino aree trattate, possono contaminare e rendere inappetenti per le formiche. Non applicare su legno o superfici porose. Nel caso in cui non sia possibile, applicare il prodotto su un foglio di plastica.

DOSE: 0.2 g/m² (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza)

Frequenza di applicazione: dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare il punto di trattamento e ricollocare l'esca se consumata.

PZ/CARTONE

4 SIRINGHE 35 g x 14 pz