



## Bluetongue

La febbre catarrale degli ovini (detta anche "lingua blu") è una malattia virale trasmessa da insetti vettori che colpisce ruminanti domestici e selvatici come pecore, capre, bovini e cervidi.

Viene trasmessa agli animali tramite le punture di alcuni moscerini del genere *Culicoides Imicola*.



## Pinkeye

La cheratocongiuntivite infettiva bovina è una patologia altamente contagiosa, non letale, ma che incide in modo determinante sull'economia dell'allevamento. Causata da un microrganismo del genere *Moraxella* viene anche denominata "pinkeye" per la formazione di un panno corneale rosa.



**Hoko Ex® e Alphi® WG sono protocolli efficaci e comprovati dall'Università di Sassari**



**Hoko Ex®**  
larvicida



**Alphi® WG**  
adulticida

○○ Granuli idrosolubili

## Hoko Ex®

La soluzione ottimale per il controllo delle fasi larvali



efficace  
contro  
*Culicoides imicola*

NEW

Ciromazina pura: 2%

Aut. Biocida: EU-0027471-0000

### CARATTERISTICHE

Larvicida regolatore di crescita (IGR) per il totale controllo delle larve di mosche e mosconi che infestano gli allevamenti zootecnici e gli ambienti civili. Compromette irreversibilmente il ciclo biologico delle larve provocandone rapidamente la morte.

### DOSI E MODI D'USO

**A spaglio:** disperdere 250 g di HOKO EX® ogni 10 m<sup>2</sup> di substrato umido (lettiera, pollina, concimaia, ecc.).  
**Diluito in acqua:** sciogliere 250 g di HOKO EX® in 1-4 L d'acqua, quindi applicare con pompe a bassa pressione ( ) su 10 m<sup>2</sup> di substrato umido oppure sciogliere 250 g di HOKO EX® in 5-10 L d'acqua e distribuire con annaffiatori o pompe irroratrici su 10 m<sup>2</sup> di substrato asciutto. Applicare il prodotto da marzo a ottobre, ogni 15 giorni circa e ripetere il trattamento ad intervalli di 2-4 settimane o quando l'accumulo di substrato supera i 10 cm.

○○ Granuli idrodispersibili

## Alphi® WG

Moschicida fortemente abbattente e a lunga persistenza



efficace  
contro  
*Culicoides imicola*

NEW

Azamethiphos puro: 10%

Reg. PMC: 20202

### CARATTERISTICHE

Insetticida per il controllo delle mosche adulte e insetti strisciante. Esplica un'azione neurotossica sugli insetti bersaglio previo contatto e/o ingestione.

### DOSI E MODI D'USO

**A spruzzo:** disperdere 1 kg in 8 L d'acqua per trattare a spot 100 m<sup>2</sup> di superfici sulle quali si posano le mosche (400-500 m<sup>2</sup> di pavimento calpestabile). **Pennello:** miscelare 1 kg con 1 L di acqua tiepida quindi stendere uniformemente sul pannello mosche o a spot nei punti dove si concentrano le mosche.

### TARGET BERSAGLIO

Mosche  
in tutti gli stadi larvali

### STADIO BERSAGLIO

Uova    Larve    Pupe    Adulti

### CODICI

SACCO 5 kg  
cod. 1010000075  
q.tà: 4 pz

SACCO 25 kg  
cod. 1010000077  
q.tà: 1 pz

### TARGET BERSAGLIO

Mosca domestica (*Musca domestica*),  
mosca pungente (*Stomoxys calcitrans*)

### STADIO BERSAGLIO

Uova    Larve    Pupe    Adulti

### CODICI

SECCHIO 1 kg  
cod. 10100 00060  
q.tà 6 pz